

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Діагностика ВІЛ-інфекції та сифілісу

Ліцензія МОЗ України
АГ № 603684 від 14.11.2011 року

Email: koki.com.ua

Пацієнт: Мельников Юрій Вікторович, 1957 р.н., (ч)
Лікар: Архипенко О. Б.
Замовлення № Кон-160531-0134

Матеріал: Сироватка
Платник: Безкоштовні області

РЕЗУЛЬТАТ
не виявлені

РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ
відсутні

Дозволив лікар: Затинацька І. В.
31.05.2016 10:39

ПОКАЗНИК
Сумарні АТ до HIV 1,2

ЗАКЛЮЧЕННЯ:

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Консультація лікуючого лікаря

Дякуємо, що скористалися послугами лабораторії!

...ності
...перивезикальне
...не розширен (до 3 мм) и
...конкрементов не виявлено.
...протяженні, обычного положення и форми, контури
...голівка 28 мм, тело 11 мм, хвост 16 мм. Паренхіма зерниста,
... (умерено). Структура не порушена. Вирсунгов проток не розширен (1,2
... обычного положення, полулунной форми, контури ровные, четкие, края слегка закруглены, не
увеличена (110x48 мм). Паренхіма ее обычной экзогенности, мелкозернистая. Структура не порушена.
Внутриселезеночные сосуды не расширены, уплотнены (единично).
V.porte: в обл. устья диаметр до 10 мм (не расширена), просвет проходим, включений нет. Кровоток
гепатопетальный, монофазный, равномерный, скорость 21 см/сек (в норме).
V.mesenterica sup.: диаметр до 5 мм (не расширена), просвет проходим, включений нет. Кровоток
гепатопетальный, монофазный, равномерный, скорость 30 см/сек (незначительно ускорена).
V.lienalis: в обл. ворот селезенки диаметр до 7 мм (не расширена), просвет проходим, включений
нет. Спектрограмма и скоростные показатели кровотока в ней не изменены (спленофугальное направление,
монофазный, равномерный характер, скорость до 23 см/с. (норма).
A.mesent.sup.: диаметр до 5 мм (не расширена), кровоток ускорен: PS=136 cm/s; EDV=16 cm/s; RI=0,88
(периферическое сопротивление нормальное).
A.hepat.pr. диаметр до 3,3 мм (не расширена): кровоток нормальный PSV=50,0 cm/s; EDV=20,0 cm/s;
RI=0,61 (периферическое сопротивление в норме).
A.lienalis: диаметр до 4,7 мм (не расширена): кровоток нормальный PSV=66,0 cm/s; EDV=18,0 cm/s;
RI=0,73 (периферическое сопротивление нормальное).
Aorta в брюшном отделе: диаметр до 14 мм (нормальный расширена), стенки ее не уплотнены.
V.cava inferior на уровне печени: диаметр до 19 мм (не расширена), включений нет, просвет проходим.
Увеличенных лимфатических узлов живота (на исследуемом уровне) не выявлено.

ВЫВОДЫ: эхо-признаки невыраженных диффузных изменений печени (с учетом данных лабораторных исследований – хр.гепатит С; ст. фиброза (METAVIR) F0-1 по эластографии).
Хр. бескаменный холецистит. Застой желчи, выраженная степень. Косвенные признаки дискинезии ЖВП.
Диффузные изменения поджелудочной железы (невыраженные, по типу реактивной панкреатопатии?,
хр.панкреатита?).

Врач:  Федусенко А.А.