

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 237/0  
Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001р.№1

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Система гемостазу

Ліцензія МОЗ України  
№ 603684 від 14.11.2011 року

Пацієнт: **Мельников Юрій Вікторович, 1957 р.н., (ч)**  
Лікар: **Архипенко О. Б.**  
Замовлення № **Кон-160531-0134**

Матеріал: **Плазма (цитрат)**  
Платник **Безкоштовні області**

**РЕЗУЛЬТАТ**  
106.0 %

**РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ**  
70.00 - 130.00 %

**ПОКАЗНИК**  
Протромбіновий індекс

Дозволив лікар: **Мазуренко Н. Ю.**  
31.05.2016 10:39

**ЗАКЛЮЧЕННЯ:**

Консультація лікуючого лікаря

**РЕКОМЕНДАЦІЇ:**

Дякуємо, що скористалися послугами лабораторії!

Селезенка обычного положения, полулунной формы, контуры ровные, четкие, края слегка закруглены, не увеличена (110x48 мм). Паренхима ее обычной эхогенности, мелкозернистая. Структура не нарушена. Внутриселезеночные сосуды не расширены, уплотнены (единично).  
V.porte: в обл. устья диаметр до 10 мм (не расширена), просвет проходим, включений нет. Кровоток гепатопетальный, монофазный, равномерный, скорость 21 см/сек (в норме).  
V.mesenterica sup.: диаметр до 5 мм (не расширена), просвет проходим, включений нет. Кровоток гепатопетальный, монофазный, равномерный, скорость 30 см/сек (незначительно ускорена).  
V.lienalis: в обл. ворот селезенки диаметр до 7 мм (не расширена), просвет проходим, включений нет. Спектрограмма и скоростные показатели кровотока в ней не изменены (спленофугальное направление, монофазный, равномерный характер, скорость до 23 см/с. (норма).  
A.mesent.sup.: диаметр до 5 мм (не расширена), кровоток ускорен: PS=136 cm/s; EDV=16 cm/s; RI=0,88 (периферическое сопротивление нормальное).  
A.hepat.pr. диаметр до 3,3 мм (не расширена): кровоток нормальный PSV=50,0 cm/s; EDV=20,0 cm/s; RI=0,61 (периферическое сопротивление в норме).  
A.lienalis: диаметр до 4,7 мм (не расширена): кровоток нормальный PSV=66,0 cm/s; EDV=18,0 cm/s; RI=0,73 (периферическое сопротивление нормальное).  
Aorta в брюшном отделе: диаметр до 14 мм (нормальный расширена), стенки ее не уплотнены.  
V.cava inferior на уровне печени: диаметр до 19 мм (не расширена), включений нет, просвет проходим. Увеличенных лимфатических узлов живота (на исследуемом уровне) не выявлено.

**ВЫВОДЫ:** эхо-признаки невыраженных диффузных изменений печени (с учетом данных лабораторных исследований – хр.гепатит С; ст. фиброза (METAVIR) F0-1 по эластографии). Хр. бескаменный холецистит. Застой желчи, выраженная степень. Косвенные признаки дискинезии ЖВП. Диффузные изменения поджелудочной железы.